

CONSUMO DE ALCOHOL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADULTOS JÓVENES

ALCOHOL USE AND DOMESTIC VIOLENCE IN YOUNG ADULTS

Doménica Jiménez Zapata ^{1*}

¹ Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Psicología Clínica. Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7997-4665>. Correo: djimenez9840@uta.edu.ec

Agueda del Rocío Ponce Delgado ²

² Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3624-0455>. Correo: adr.ponce@uta.edu.ec

* Autor para correspondencia: djimenez9840@uta.edu.ec

Resumen

La presente investigación se centró en determinar la correlación entre el consumo de alcohol en hombres funcionarios de una empresa privada y la violencia intrafamiliar en mujeres esposas de estos funcionarios. Para lograrlo, se emplearon instrumentos estandarizados como el test de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol “AUDIT” administrado a los esposos, la escala de medición de la violencia intrafamiliar (VIFJ4) aplicado únicamente a las esposas. Los resultados de la investigación revelaron una fuerte correlación positiva entre el consumo de alcohol en hombres y la violencia intrafamiliar en mujeres ($p < 0.001$), una prevalencia considerable de consumo excesivo de alcohol entre la población estudiada, así como una alta incidencia de violencia intrafamiliar, especialmente de hombres hacia mujeres. Además, se identifican diferencias significativas en el consumo de alcohol en hombres según el nivel socioeconómico, destacando una asociación entre un menor estatus socioeconómico y un mayor consumo de alcohol.

Palabras clave: Consumo de alcohol; violencia Intrafamiliar; adultos jóvenes; parejas

Abstract

The present research focused on determining the correlation between alcohol consumption in male employees of a private company and domestic violence in the wives of these employees. To achieve this, standardized instruments were used, such as the “AUDIT” alcohol consumption disorders identification test administered to the husbands, the scale for measuring intrafamily violence (VIFJ4), applied only to the wives. The results of the investigation revealed a strong positive correlation between alcohol consumption in men and domestic violence in women ($p < 0.001$), a considerable prevalence of excessive alcohol consumption among the

population studied, as well as a high incidence of domestic violence, especially from men towards women. In addition, significant differences were identified in alcohol consumption in men according to socioeconomic level, highlighting an association between lower socioeconomic status and higher alcohol consumption.

Keywords: *domestic violence; alcohol consumption; young adults; partners*

Fecha de recibido: 21/03/2024

Fecha de aceptado: 30/05/2024

Fecha de publicado: 01/07/2024

Introducción

El vínculo entre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar ha sido objeto de un creciente interés tanto en el ámbito académico como en el social debido a la gravedad del daño, la discapacidad y la mortalidad que ocasiona, así como las múltiples y variadas consecuencias en los planos social, psicológico y biológico (Walton & Pérez, 2019). La intersección de estos dos fenómenos plantea importantes interrogantes sobre la salud pública y la salud mental, ya que la violencia en el hogar continúa siendo un problema significativo en todo el mundo (López & Rubio, 2020).

Las estimaciones mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) señalan que una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia de pareja, señalando el consumo de alcohol como un factor importante en la violencia intrafamiliar. En informes sobre la violencia contra la mujer la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2003) indica que la violencia de pareja es la forma más común de violencia contra la mujer. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Así mismo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2019) muestra como resultado de sus encuestas cifras preocupantes ante esta problemática indicando que el 76% de mujeres en el Ecuador ha sido violentada por su pareja o ex parejas.

Tomando en cuenta la relevancia del problema se define a la violencia como una forma de ejercicio de poder del abusador que facilita la opresión, dominio o supremacía hacia la víctima que enmarca una clara posición de sometimiento o sujeción hacia la persona que la sufra (Nateras González, 2021). De igual forma, la violencia se puede definir como el uso intencional de la fuerza física, psicológica, sexual, institucional, verbal o social para causar daño o intimidar a una persona, grupo o comunidad. Este comportamiento puede manifestarse de diversas maneras y en distintos contextos, incluyendo el ámbito doméstico, social, político o económico (Walton & Pérez, 2019).

Específicamente la violencia intrafamiliar se caracteriza por cualquier acto u omisión que afecte negativamente la libertad y el desarrollo de los individuos involucrados, ya sea entre miembros de una misma familia o entre habitantes del hogar (Pérez & Aparicio, 2021). Esta forma de violencia puede entenderse como una dinámica jerárquica, puede manifestarse en cualquier tipo de estructura familiar. Aunque es más común en el entorno doméstico, su alcance no se limita únicamente a este ámbito (Jampersa et al., 2023).

La violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol son dos variables que, aunque aparentemente independientes, están estrechamente entrelazadas y a su vez se han normalizado en este contexto. Esta normalización oculta su verdadero impacto en la vida cotidiana y subraya la necesidad de una mayor atención a nivel de salud pública. La intersección de estas variables revela la complejidad de los desafíos que enfrentan las comunidades en la prevención y la intervención de la violencia intrafamiliar, destacando la importancia de abordar tanto el consumo de alcohol como la violencia en el hogar (Fernández-Castillo et al., 2021).

Por otro lado, se define el consumo de alcohol como la ingesta de bebidas alcohólicas de manera frecuente, y varía desde un consumo moderado hasta un consumo excesivo o problemático. (Organización Mundial de la Salud, 2022). Por lo tanto, el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA, 2024), indica que el consumo de alcohol es un fenómeno que merece atención en la salud pública y el impacto potencial en diversas áreas de la vida.

En diferentes estudios se han abordado las conductas agresivas y el consumo de alcohol. Como Robertson et al. (2020) quienes mencionan que el consumo excesivo de alcohol está estrechamente relacionado con la perpetración de diferentes formas de agresión, incluyendo agresión física, verbal, general e ira. La desinhibición asociada al consumo de alcohol puede exacerbar tensiones existentes en el entorno familiar, dando lugar a conflictos que pueden escalar hacia la agresión física o verbal (Roach et al., 2022).

Con respecto al género las conductas agresivas muestran como resultado un índice mayor de agresión en los hombres que en las mujeres al haber consumido alcohol (Sontate et al., 2021). En este estudio observaron una relación positiva y significativa entre el consumo de alcohol y el maltrato psicológico ejercido por los hombres. El consumo perjudicial en las mujeres se relacionó positivamente con el ser víctimas de abuso psicológico (Facundo et al., 2019). El consumo de alcohol, a pesar de ser ampliamente visto como una bebida social y legal, no suele ser percibido como una droga por la mayoría de las personas, lo que ha llevado a su normalización (Katalina et al., 2023). No obstante, se ha revelado una alta tasa de mortalidad y comportamientos agresivos relacionados con su consumo de alcohol, destacando una mayor incidencia de violencia, especialmente de hombres hacia mujeres (Bueno, 2021).

Se han desarrollado investigaciones identificando factores asociados como pueden ser la edad, el género, el sexo entre otros, de este modo Sontate et al. (2021) mencionan que la agresión inducida por el consumo de alcohol es una interacción entre: el sexo, la genética, las enfermedades psiquiátricas, el nivel de alcohol en sangre y los factores ambientales. En este sentido, el autor Hsu (2024) en su investigación concluye que sus grupos de estudio no mostraron diferencias importantes de correlación en cuanto a factores asociados como edad, severidad del consumo de alcohol, gravedad de la depresión, ansiedad o calidad del sueño, estado civil, nivel educativo, situación laboral, historial familiar de problemas con el alcohol, inicio del consumo de alcohol, duración del consumo, intentos de dejar el alcohol.

Bhatta et al. (2021) concluyen que tener un esposo o pareja sentimental con conductas de consumo de alcohol es un factor de riesgo importante para la violencia doméstica contra la mujer. Es crucial evaluar el consumo de alcohol como factores de riesgo para la violencia doméstica (Grigorian et al., 2020). Existen patrones en la relación entre el consumo de alcohol y la violencia doméstica, como pueden ser la etnia del abusador o el haber consumido alcohol antes de la agresión (Bell et al., 2019). Se considera, por tanto, que el alcohol

incrementa o exacerba la violencia, produciéndose episodios de mayor intensidad de esta cuando se consume alcohol que cuando no se consume (Llopis et al., 2019).

Se afirma que el consumo de alcohol en los hombres está relacionado con el 40% al 60% de los casos de violencia hacia la mujer en la pareja (Llopis et al., 2019). Confirmando así que existe correlación entre el consumo de alcohol y la violencia en la pareja (Hernández et al., 2023). Por otro lado, estos autores han identificado que no existe correlación entre el consumo de alcohol y la violencia de pareja (Martínez et al., 2020). En los datos agrupados, las mujeres cuyas parejas consumían alcohol tenían más probabilidades de experimentar violencia física, violencia emocional y violencia sexual en comparación con aquellos cuyas parejas no consumían alcohol (Bunga et al., 2022).

El consumo de alcohol ha sido relacionado con la violencia intrafamiliar. En la investigación realizada por Bunga et al., (2022) en su estudio infieren que la mayoría de las parejas experimentaron violencia intrafamiliar, insatisfacción conyugal y bienestar deficiente cuando su conyugue es consumidor de alcohol. Otros autores mencionan que el consumo de alcohol, en muchos casos, puede actuar como un catalizador que intensifica y desencadena episodios de violencia intrafamiliar (Eashwar et al., 2020). La salud mental de las mujeres cuyas parejas tienen dependencia del alcohol está significativamente amenazada y debe ser considerada, especialmente cuando está asociada con la exposición a la violencia intrafamiliar (Dostanic et al., 2022).

En el ámbito socioeconómico Meneses et al., (2019) exponen que un nivel socioeconómico bajo o en situación de pobreza hacen que los individuos sean vulnerables al consumo excesivo de alcohol. Al igual que Salcedo et al., (2018) quienes observaron en su estudio las mismas manifestaciones como el tener ingresos menores al básico, tener mala relación con los padres hace que la población de hombres jóvenes tenga más riesgo de consumo de alcohol en la muestra total.

En este contexto, donde la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol se entrecruzan, surge la necesidad de comprender más a fondo la relación entre ambas variables permitiendo investigar las mismas en la dinámica y su impacto en la salud pública y mental. En consecuencia, el objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar en adultos jóvenes del cantón Salcedo. En este estudio se buscó arrojar luz sobre la dinámica entre estas dos variables en un contexto particular, ya que se evaluó el consumo de alcohol únicamente a los hombres esposos, para contribuir a la comprensión de los factores que afectan proporcionalmente a la violencia intrafamiliar dirigida hacia las mujeres esposas dentro del ámbito intrafamiliar en la población de adultos jóvenes.

Materiales y métodos

El enfoque que se desarrolló en la presente investigación fue cuantitativo debido a que se emplea la recopilación de datos para verificar hipótesis mediante mediciones numéricas y análisis estadísticos. Fue un diseño no experimental, puesto que, el investigador observó lo que ocurre de forma natural sin realizar ninguna acción. Su alcance es correlacional y se desarrolló con un corte transversal que consiste en recopilar datos de una muestra representativa en un solo momento.

Población

Se utilizó un muestreo intencional y se seleccionaron a 91 hombres de una empresa privada y a sus esposas del cantón Salcedo, de la provincia Cotopaxi, Ecuador. Se tomaron como criterios de inclusión: tener cónyuge, tener de 25 a 40 años de edad, haber firmado el consentimiento informado y mantener el deseo de participación en el estudio. Los criterios de exclusión fueron; tener discapacidad visual, física e intelectual que impida completar la prueba psicométrica, tener nula experiencia sobre alcohol o su consumo, estar bajo los efectos de alcohol u otras drogas al momento de ser evaluado.

Instrumentos

Para recolección de la información sobre los niveles de consumo de alcohol, se utilizó el cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol “Test AUDIT”, el cual fue aplicado solo a los hombres que tengan conyugue de una empresa privada, está compuesto por 10 ítems. La primera pregunta estuvo compuesta por una escala tipo Likert en la cual 0 corresponde “Nunca”; 1 corresponde “Una o menos veces al mes”; 2 corresponde “De 2 a 4 veces al mes”; 3 corresponde “De 2 a 3 veces por semana”; 4 corresponde “4 o más veces a la semana”. La segunda pregunta en escala Likert la cual 0 corresponde “1 a 2”; 1 corresponde “3 a 4”; 2 corresponde “5 a 6”; 3 corresponde “7,8 o 9”; 4 corresponde “10 o más”. A continuación, las preguntas de la 3 a la 8 se puntúan en escala Likert de 4 puntos, donde 0 representa “nunca”; 1 corresponde “Menos de una vez al mes”; 2 corresponde “Mensualmente”; 3 corresponde “Semanalmente”; 4 corresponde “a diario o casi a diario”. Los 2 últimos ítems utilizan una escala donde 0 corresponde “no” y 4 corresponde “si, durante el último año”. Las puntuaciones se interpretaron desde 0 a 7 indica riesgo bajo, entre 8 a 15 indica riesgo medio, entre 16 a 19 indica riesgo alto y puntuaciones de entre 20 a 40 puntos indica probable adicción. El test AUDIT mostró una consistencia interna alta α de Cronbach=0,812 (Seguel et al., 2013).

El instrumento para la recolección de datos de la violencia intrafamiliar fue la escala de medición de la violencia intrafamiliar (VIFJ4), el cual fue aplicado solo a las mujeres esposas de los funcionarios de la empresa privada, está compuesto por 25 ítems de puntuación Likert correspondiendo: 1 “Casi nunca”; 2 “Pocas veces”; 3 “A veces”; 4 “Muchas veces” y 5 “Casi siempre”. Interpretándose de la siguiente manera: **Puntaje total:** puntuaciones menores o iguales a 35 puntos violencia leve; 36 a 67 puntos violencia moderada; mayor o igual a 68 puntos violencia severa. La escala VIFJ4 mantuvo un Alfa de Cronbach de 0,938 (Oyervide et al., 2014).

Técnica de recolección de datos

En primera instancia, se obtuvo la autorización pertinente por quienes están al frente de la empresa privada. Para proceder con la investigación, se pidió un listado de los funcionarios de estado civil casado, a continuación se brindó una explicación detallada y clara sobre la investigación pidiendo la colaboración de sus esposas en horarios que se adapten a la disponibilidad de tiempo de cada pareja, se obtuvo la afirmación de 91 funcionarios y sus esposas, se procedió a explicar cada uno de los instrumentos y a aplicar, a su vez se dejaron claros los posibles beneficios, así como el derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencia alguna. Se presentó los protocolos y se proporcionó una explicación acerca de los objetivos y procedimientos del estudio lo cual ayudo a obtener el consentimiento informado de cada pareja de participantes, mismo que permitió que la aplicación de los instrumentos se llevara a cabo de forma ética y legal.

Posterior a esto, se estableció las fechas y horarios de manera que no interfieran en los horarios laborales de los funcionarios y sus parejas. La aplicación de los instrumentos se realizó de forma personalizada a cada pareja se tomó primero al hombre el reactivo que evalúa consumo de alcohol y después a la mujer el instrumento que evalúa violencia intrafamiliar. La aplicación duro un tiempo estimado de 40 minutos. La recolección fue en Microsoft Excel y analizados en el software Jamovi 2.3.19.

Resultados y discusión

Dado que de acuerdo a la aplicación de la prueba Shapiro Wilk la distribución de las puntuaciones de consumo de alcohol y violencia no fueron normales, se aplicó la prueba de correlación de Spearman encontrando que existió una correlación positiva fuerte entre estas variables ($Rho = 0.875$, $p < 0.001$).

Tabla 1. Correlación consumo de alcohol y violencia intrafamiliar.

Violencia	Consumo de alcohol	
	Rho de Spearman	0.875 ***
valor p	< .001	

Nota. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.

Tabla 2. Nivel de consume.

Nivel de consumo	Frecuencias	% del Total
Riesgo bajo	10	11.0 %
Riesgo medio	15	16.5 %
Riesgo alto	2	2.2 %
Posible dependencia	64	70.3 %

Con relación al nivel de consumo el 70.3% presento un nivel de consumo alto, 16,5% un nivel de consumo medio, el 11,0% un nivel de consumo bajo, el 2,2% un riesgo alto.

Tabla 3. Nivel de violencia

Nivel de violencia	Frecuencias	% del Total
Leve	38	41.8 %
Moderado	39	42.9 %
Severo	14	15.4 %

En relación al nivel de violencia intrafamiliar el 42,9% de las participantes presento un nivel moderado, el 41,8% un nivel leve, el 15,4% un nivel severo.

Tabla 4. Prueba de Kruskai Wallis entre parejas - Consumo de Alcohol.

		W	P
Alto	Medio	6.33	< .001
Alto	Bajo	5.12	< .001
Medio	Bajo	2.64	0.148

Dado que no se cumplió el supuesto de normalidad se aplicó la prueba de Kruskai Wallis encontrando que, si existieron diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones del nivel socio económico bajo,

con el alto y del alto con el medio, mientras que el nivel medio con el bajo no se encontró diferencias estadísticamente significativas.

Discusión

En la presente investigación se determinó la relación entre el consumo de alcohol en los esposos y la violencia intrafamiliar ejercida hacia las esposas, se encontró una correlación positiva fuerte. Esta correlación refuerza hallazgos previos, en los cuales Llopis et al., (2019) tras haber realizado una investigación a 50 parejas reveló que, aunque los hombres que beben alcohol tienden a agredir a sus parejas con mayor frecuencia cuando están sobrios, el consumo de alcohol en general aumenta la cantidad de violencia ejercida.

Por otro lado, Katerndahl et al., (2021) tras investigar a 20 parejas, encontró que la relación entre el consumo de alcohol y la violencia es compleja y no lineal. Esto significa que no se puede predecir de manera precisa cómo el consumo de alcohol afectará el comportamiento violento. Además, en este último estudio, los autores mencionan que existió cierta deseabilidad social en las respuestas proporcionadas por los hombres acerca de los actos violentos y que, a su vez, el consumo de alcohol disminuyó mientras se realizaba el estudio. Mientras que los otros estudios no presentaron estas características ya que fueron evaluados en un solo momento.

Estos estudios exploraron la relación entre el consumo de alcohol en hombres y la violencia intrafamiliar en mujeres en contextos relacionales cercanos, ya que se realizaron en población masculina y femenina en su dinámica de pareja. Aunque los contextos difieren en aspectos demográficos y en que la población elegida ya presentaba antecedentes de violencia, los resultados subrayan similitudes a pesar de estas particularidades, se enfatizó la importancia de abordar el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar como problemas de salud pública, y resalta la necesidad de intervenciones dirigidas a prevenir y mitigar estos fenómenos.

En el presente estudio el nivel de consumo de alcohol en la mayoría de los esposos de la presente investigación fue posible dependencia, así mismo Castaño & Calderon , (2014) encontraron un consumo alto en la mayoría de participantes, en contraste en el estudio realizado por (Catalá-Miñana et al., 2013) destacan que la mayoría presentaron un riesgo bajo. Estas diferencias pueden atribuirse a las características únicas de la población estudiada debido a que esta última fueron hombres juzgados por violencia intrafamiliar lo cual puede atribuirse a la deseabilidad social y confinamiento, incluidos factores socio-culturales, demográficos, diferencias en los grupos etarios y contextuales que pueden influir en los patrones de consumo de alcohol y en la percepción del riesgo asociado a este comportamiento.

Los resultados obtenidos en este estudio muestran similitudes significativas con los hallazgos de la investigación realizada por Ñauta et al., (2019) en relación al nivel de violencia intrafamiliar experimentada por las participantes. Ambos estudios revelan una alta prevalencia de violencia. Es notable que, aunque las cifras exactas pueden variar ligeramente entre los estudios, la tendencia general es consistente: un porcentaje significativo de mujeres experimentan algún grado de violencia en el ámbito familiar.

Además, la proporción de participantes que experimentan niveles severos de violencia, aunque menor que los niveles moderados y leves, sigue siendo considerable en ambos estudios. En el mismo sentido, Chalco, (2021) revela que la mayoría de la población presenta un nivel severo de violencia intrafamiliar. Esto puede atribuirse a que estas investigaciones fueron en mujeres en situaciones de violencia, mientras que en la presente investigación fueron mujeres que no habían denunciado la violencia o no eran víctimas de la misma.

La comparación entre el consumo de alcohol y las variables socioeconómicas se ha observado en varios estudios, lo que sugiere la presencia de patrones recurrentes y significativos en esta relación. Debido a que la población estudiada cumple una jornada laboral desgastante y no obtiene los ingresos económicos adecuados, el nivel de estrés, la edad, el ser jefes de familia y otros factores podrían influir en la exacerbación del consumo. Por lo tanto, los resultados de esta investigación, indican que las personas con un nivel socioeconómico bajo son más vulnerables al consumo de alcohol que aquellas con un nivel alto, debido a que existen diferencias significativas, coinciden con los hallazgos de Meneses et al., (2019) quienes confirmaron que los factores asociados con un bajo nivel socioeconómico pueden predisponer a los individuos a un consumo excesivo de alcohol.

Además, la prevalencia de consumo de alcohol ha sido vinculada con problemas socioeconómicos y familiares en otros estudios, como lo señalan Salcedo et al., (2018). Estos resultados sugieren una relación compleja entre el entorno socioeconómico y el consumo de alcohol, donde las condiciones desfavorables pueden aumentar el riesgo de consumo excesivo como son los ingresos económicos menores a un básico, mala relación con la familia, endeudamiento, estrés. En conjunto, estos hallazgos destacan la importancia de considerar los determinantes socioeconómicos en la formulación de estrategias de prevención y tratamiento del consumo de alcohol.

Conclusiones

Se concluyó que existe una correlación positiva y significativa entre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar. Esto sugiere, que se establece una relación directa donde un mayor consumo de alcohol en los esposos se relaciona con una mayor manifestación de violencia intrafamiliar hacia las esposas.

Los resultados obtenidos en este estudio en cuanto al nivel de consumo de alcohol en los hombres adultos jóvenes. Destaca significativamente que los participantes mostraron una posible dependencia, lo que sugiere una prevalencia considerable de consumo excesivo de alcohol en esta muestra. Además, una minoría reportó un nivel de consumo alto.

Los resultados de violencia intrafamiliar experimentada por las mujeres en la muestra analizada. Es que la mayoría de las participantes reportara un nivel de violencia intrafamiliar moderado. Mientras que la minoría presentó un nivel severo de violencia. Sin embargo, es imperativo reconocer que cualquier forma de violencia intrafamiliar es inaceptable y tiene consecuencias devastadoras para las víctimas.

Los hallazgos de este estudio revelan diferencias significativas en el consumo de alcohol según el nivel socioeconómico de los participantes. Los datos destacan una marcada disparidad, donde aquellos con un nivel socioeconómico bajo presentaron una diferencia estadísticamente significativa, en comparación con los participantes de nivel socioeconómico alto. Además, se observó una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de nivel socioeconómico alto y medio, esto podría hacer referencia a que las personas con un nivel socioeconómico bajo presentan más alto nivel de estrés y limitaciones en el acceso a recursos de salud mental, lo que puede llevar a un mayor consumo de alcohol como mecanismo de afrontamiento. Estas circunstancias pueden contribuir a establecer una relación clara entre un menor estatus socioeconómico y un mayor consumo de alcohol.

Referencias

- Bell, N. S., Harford, T. C., Fuchs, C. H., McCarroll, J. E., & Schwartz, C. E. (2019). Spouse abuse and alcohol problems among white, african american, and Hispanic US Army soldiers. *ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH*, 30(10), 1721-1733. <https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.2006.00214.x>
- Bhatta, N., Assanangkornchai, S., & Rajbhandari, I. (2021). ¿El consumo de alcohol por parte del marido aumenta el riesgo de violencia doméstica durante el embarazo y el puerperio en las mujeres nepalesas? *BMC Public Health*, 21(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-10021-y>
- Bueno, V. E. (2021). Consumo de alcohol y violencia en contra de la mujer en la emergencia sanitaria de la covid-19. *Revista Científica Retos de la Ciencia*, 5(11), Article 11. <https://retosdelacienciaec.com/Revistas/index.php/retos/article/view/353>
- Bunga, D., Bipeta, R., & Molanguri, U. (2022). A cross-sectional study on domestic violence, marital satisfaction, and quality of life among partners of patients with alcohol use disorder. *Archives of Mental Health*, 23(1), 18. https://doi.org/10.4103/amh.amh_77_21
- Castaño-Perez, G. A., & Calderon-Vallejo, G. A. (2014). Problemas asociados al consumo de alcohol en estudiantes universitarios. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 22, 739-746. <https://doi.org/10.1590/0104-1169.3579.2475>
- Catalá-Miñana, A., Lila, M., & Oliver, A. (2013). Consumo de alcohol en hombres penados por violencia contra la pareja: Factores individuales y contextuales. *Adicciones*, 25(1), 19. <https://doi.org/10.20882/adicciones.68>
- Challco, D. (2021). *Violencia familiar y resiliencia en madres de la comunidad campesina de quiquijana-cusco, 2020-2021* [Autónoma de Inca]. <http://repositorio.autonomaedu.pe/bitstream/autonomaedu/905/1/Dania%20Challco%20Mayhuire.pdf>
- Dostanic, N., Djikanovic, B., Jovanovic, M., Stamenkovic, Z., & Đeric, A. (2022). The Association Between Family Violence, Depression and Anxiety Among Women Whose Partners Have Been Treated for Alcohol Dependence. *Journal of Family Violence*, 37(2), 313-324. <https://doi.org/10.1007/s10896-020-00238-1>
- Eashwar, V. M. A., Umadevi, R., & Gopalakrishnan, S. (2020). Alcohol consumption in India– An epidemiological review. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 9(1), 49. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_873_19
- Facundo, F. R. G., Almanza, S. E. E., Rodríguez, S. A. A., Robles, I. Y. E., & Hernández, T. H. (2019). Consumo de alcohol en jóvenes y su relación con la violencia psicológica en el noviazgo. *SMAD. Revista eletrônica saúde mental álcool e drogas*, 5(2), 1-14. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1806-69762009000200004&lng=pt&nrm=iso&tlng=es

- Fernández-Castillo, E., Molerio-Pérez, O., Garcia de Nascimento, P., Rodríguez-Martínez, Y., Fernández-Castillo, E., Molerio-Pérez, O., Garcia de Nascimento, P., & Rodríguez-Martínez, Y. (2021). Consumo de alcohol y factores relacionados en estudiantes universitarios cubanos. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 20(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1729-519X2021000200017&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Grigorian, H. L., Brem, M. J., Garner, A., Florimbio, A. R., Woltbrd-Clevenger, C., & Stuart, G. L. (2020). Alcohol Use and Problems as a Potential Mediator of the Relationship Between Emotion Dysregulation and Intimate Partner Violence Perpetration. *PSYCHOLOGY OF VIOLENCE*, 10(1), 91-99. <https://doi.org/10.1037/vio0000237>
- Hernández, G. B., Amador, A. T., Noriega, J. Á. V., & Quintana, J. T. (2023). Consumo de alcohol y violencia ejercida en el noviazgo en estudiantes universitarios de pueblos originarios. *Revista Internacional de Investigación en Adicciones*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.28931/riiad.2023.1.08>
- Hsu, W.-Y. (2024). Occurrence and Correlates of Domestic Violence among Asian Patients with Alcohol Use Disorder Seeking Treatment for Cessation. *Alcohol*. <https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2024.01.002>
- Instituto Nacional de Estadística y censos. (2019, abril 26). *Encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres*. INEC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/sitio_violencia/presentacion.pdf
- Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA). (2024). *El alcohol y los adultos jóvenes*. <https://www.niaaa.nih.gov/alcohols-effects-health/alcohol-topics/datos-y-estadisticas-sobre-el-alcohol/el-alcohol-y-los-adultos-jovenes-de-18-25-anos>
- Jampersa, L., Paisca, A. B., Araújo, C. M. de, & Massi, G. A. de A. (2023). Violência intrafamiliar e fonoaudiologia: Uma análise do conteúdo. *Audiology - Communication Research*, 28, e2808. <https://doi.org/10.1590/2317-6431-2023-2808pt>
- Katalina, G. R. A., Toro, N., Carolina, D., & Giuliana, V. M. A. (2023). *Relationship between the risk of alcohol consumption and academic stress in night law and public accounting students at the mariana university in the city of pasto*.
- Katerndahl, D., Burge, S. K., Ferrer, R. L., Becho, J., & Wood, R. (2021). Complex Relationship Between Daily Partner Violence and Alcohol Use Among Violent Heterosexual Men. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(23-24), 10912-10937. <https://doi.org/10.1177/0886260519897324>
- Llopis, C., Rodríguez García, M. I., & Hernández Mancha, I. (2019). Relación entre el consumo abusivo de alcohol y la violencia ejercida por el hombre contra su pareja en la unidad de valoración integral de violencia de género (UVIVG) de Sevilla. *Cuadernos de Medicina Forense*, 20(4), 151-169. <https://doi.org/10.4321/S1135-76062014000300002>
- López-Hernández, E., & Rubio-Amores, D. (2020). Reflexiones sobre la violencia intrafamiliar y violencia de género durante emergencia por COVID-19. *CienciAmérica*, 9(2), 312-321. <https://doi.org/10.33210/ca.v9i2.319>

- Martínez, D., Gutiérrez-Ruiz, M. A., Soto-Cisneros, D. M., Rodríguez-Nava, V. F., Gómez-Cardona, J. P., & Rodríguez-Ramírez, J. M. (2020). Relación entre consumo de alcohol y violencia de pareja en estudiantes de educación superior. *Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 28(2), 75-81. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=95332>
- Meneses, K., Cisneros, M. V., & Braganza, M. E. (2019). Análisis socioeconómico del consumo excesivo de alcohol en Ecuador. *Revista Ciencias de la Salud*, 17(2), 293-308. <https://www.redalyc.org/journal/562/56259511009/html/>
- Nateras González, M. E. (2021). Aproximación teórica para entender la violencia desde un enfoque crítico. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 23(2), 305-324. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7920866>
- Ñauta, J. P. A., Álvarez, J. F. B., & Ochoa, J. S. C. (2019). *Elaboración y validación de una escala de violencia intrafamiliar en las usuarias de las unidades de violencia, cuenca. Junio—Noviembre 2013.*
- Organización Mundial de la Salud. (2021, abril 8). *Violencia contra la mujer*. Organización Mundial de la Salud. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). *Alcohol*. Organización Mundial de la Salud. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>
- Organización Panamericana de la Salud (Ed.). (2003). *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Organisation mondiale de la santé.
- Oyervide, J. J., Bermeo Álvarez, J., Caldas Ochoa, J., & Astudillo Ñauta, J. (2014). Construcción de una escala de violencia intrafamiliar, Cuenca—Ecuador 2013. *Rev. Fac. Cienc. Méd. Univ. Cuenca*, 30-39. <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/medicina/article/view/885/783>
- Pérez, M. A. O., & Aparicio, C. X. P. de. (2021). Violencia intrafamiliar: La reparación integral como un derecho en el Ecuador. *Iuris Dictio*, 28, Article 28. <https://doi.org/10.18272/iu.v28i28.2145>
- Roach, A. L., Ermer, A. E., Coleman, M., & Ganong, L. (2022). Attitudes About Intimate Partner Violence and Alcohol Consumption. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(1-2), 726-742. <https://doi.org/10.1177/0886260520914583>
- Robertson, K., Forbes, S., & Thyne, M. (2020). Perpetration of Alcohol-Related Aggression by Male and Female College Students: An Examination of Overt and Relational Aggression. *JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE*, 35(5-6), 1454-1475. <https://doi.org/10.1177/0886260517696872>
- Salcedo, F. E., Alvis Zakzuk, J. S., Paz Wilches, J. J., Manrique-Mclean, J. P., Jerez-Arias, M., Alvis-Guzmán, N. R., Salcedo-Mejía, F. E., Alvis-Zakzuk, J. S., Paz-Wilches, J. J., Manrique-Mclean, J. P., Jerez-Arias, M., & Alvis-Guzmán, N. R. (2018). Prevalencia y factores socioeconómicos asociados al consumo de alcohol en jóvenes de hogares pobres en la subregión Montes de María, en el Caribe colombiano. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 36(2), 37-48. <https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v36n2a06>

- Seguel, F., Santander Manríquez, G., & Alexandre Barriga, O. (2013). Validez y confiabilidad del test de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol (audit) en estudiantes de una universidad chilena. *Ciencia y enfermería*, 19(1), 23-35. <https://doi.org/10.4067/S0717-95532013000100003>
- Sontate, K. V., Rahim Kamaluddin, M., Naina Mohamed, I., Mohamed, R. M. P., Shaikh, M. F., Kamal, H., & Kumar, J. (2021). Alcohol, Aggression, and Violence: From Public Health to Neuroscience. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.699726>
- Walton, S. M., & Pérez, C. A. S. (2019). La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual. *Gaceta Médica Espirituana*, 21(1), Article 1. <https://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/1747>